



要如何確認是否感染愛滋病毒(HIV)?

疾病管制署慢性傳染病組

透過愛滋病毒檢驗連結預防及醫療照護服務



愛滋自我篩檢

● 還可以購買愛滋自我篩檢試劑，自行篩檢!!

- ✓ 為愛滋抗體初步檢驗，於感染後23-90天才能檢測出是否感染愛滋病毒
- ✓ 若愛滋自我篩檢陽性：代表可能感染了愛滋病毒，但並非100%確定感染(少數可能是偽陽性)，即使沒有感到不適，請儘速至愛滋指定醫事機構進行確認檢驗



疾管署自我篩檢網站(看影片)
<https://hiva.cdc.gov.tw/oraltest/>

- 衛生局所/民間團體**403**個實體通路
- **39**台自動服務機
- 網路訂購便利超商取貨
超商(7-Eleven、全家)
超過**9,100**家門市



完成篩檢後上網登錄檢驗結果(匿名)
經審核後可獲得電子兌換券1張
可兌換免費試劑再次篩檢

試劑兌換券

COUPON

匿名篩檢

迅速診斷，即時銜接治療，降低失聯率

- 免費提供服務
- 檢驗過程以匿名方式進行
- 由專人提供衛教諮詢及轉介就醫(含確認檢驗)
- 2021年參與醫院共**66**家
 - 53家醫院 (愛滋combo抗原/抗體快速篩檢)
 - 13家一站式醫院 (愛滋combo抗原/抗體快速篩檢+快速確診)



匿名篩檢服務地點：
<https://reurl.cc/V3goGQ>



多元化愛滋病毒檢驗及諮詢服務管道



各縣市衛生局/所、 同志健康社區服務中心

- 提供愛滋病毒檢驗及衛教諮詢服務
- 不定期舉辦社區外展愛滋篩檢活動
- 協助轉介預防及醫療照護服務

服務地點：

<https://reurl.cc/V3goGQ>



愛滋指定醫事機構

- 2021年全國計有指定醫院**83**家、診所**1**家、藥局**56**家
- 提供愛滋病毒檢驗及衛教諮詢、感染者醫療照護等服務
- 整合式篩檢服務(健康檢查常規附加愛滋病毒檢驗選項)

指定醫事機構服務地點：

<https://reurl.cc/kVWIYx>



資料來源：

疾管署全球資訊網(<https://www.cdc.gov.tw>)/傳染病與防疫專題/第三類法定傳染病/人類免疫缺乏病毒(愛滋病毒)感染

空窗期

- 感染愛滋病毒後，需要經過一段時間才能在血(體)液中檢測到愛滋病毒抗原或抗體，這段**已感染卻無法檢驗出已感染的時間即為「空窗期」**
 - ✓ 空窗期間雖然無法透過檢驗方法檢測是否感染，但此時**體內已存在愛滋病毒，且已具有傳染力**。
 - ✓ 若與他人發生不安全性行為後立即檢驗為陰性，但仍懷疑自身感染者，建議可於空窗期後再次檢驗，且此期間**應避免與他人發生不安全性行為**。

抗原/抗體複合型快速初步檢驗最快需要**21天**(3~12週)

抗體初步檢驗需要**23-90天**(4~12週)



潛伏期快者半年，慢者可長達10年

若及時治療控制體內愛滋病毒量，可有效延緩AIDS發病情形

愛滋病毒檢驗對象與頻率

● 建議愛滋病毒檢驗對象與頻率

- ✓ 有**性行為**者，建議至少進行**1**次愛滋篩檢
- ✓ 有**不安全性行為**者，建議**每年**至少進行**1**次愛滋篩檢
- ✓ 若有**感染風險行為**(如與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染性病等)，建議每**3至6個月**篩檢**1**次



**鼓勵民眾定期接受愛滋病毒檢驗，
早期發現、早期治療**

我在意健康 所以我篩檢

我應該做愛滋篩檢嗎？

- 有性行為者
至少進行1次篩檢。
- 有無害性行為者
每年至少進行1次篩檢。
- 有增加風險感染之行為
如共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、曾感染性病，則建議每3至6個月篩檢1次。

可以去哪裡篩檢？

- 醫療院所、民間團體及衛生局(所)都有提供愛滋篩檢服務
- 請洽1922防疫專線
不定時會推出篩檢活動，如自我篩檢、社區篩檢等。

+ 篩檢前

- 速就醫
如有異常症狀應立即進行確認檢驗，避免篩檢的陽性與陰性結果為已感染，果然身體狀況會導致複雜性結果。
- 速治療
抗HIV藥物治療能降低感染風險，並可預防病毒，從篩檢結果出來後馬上治療，應立即一人先調，請從醫藥局和藥房，與其他藥物一樣可帶回家好好控制。

- 篩檢後

- 定期篩檢
性行為高風險，定期檢到幫助再進行有發性的時間點進行，則可能處於安全期。
- 持續愛滋防制措施
預防愛滋感染，性行為全程使用保險套，另外應避免與新舊性伴侶發生性行為，詳情請洽 <https://www.cdc.gov.tw>

愛滋篩檢注意事項：

- ★ 窗口期：指的是「感染愛滋病毒後，到可以被檢出來的時間」。
- ▲ 目前所知所有人體質檢驗方式皆不同。
- ▲ 目前最新式的檢驗儀，檢測法可將窗口期縮短至11天，一般檢驗檢驗需23-90天，抗HIV標準化式檢驗則為21天。

仍有10%愛滋病毒感染者未知自己感染狀態



仍有**10%**愛滋病毒感染者 未知自己感染狀態


代表這些潛在感染者尚未接受治療



透過定期愛滋病毒檢驗瞭解自身健康狀態

- 初步檢驗(篩檢)+確認檢驗，依據檢驗結果，由專人提供個人化諮詢、衛教及關懷服務。
- 確診感染者：及早診斷及早治療，降低愛滋病毒社區傳播風險。
- 檢驗陰性者：獲得衛教諮詢、轉介預防服務等，避免感染愛滋病毒。

資料更新至2021/4/13



愛滋篩檢，為愛篩檢

保護自己及你所愛的人

