

## 埃及斑蚊和白線斑蚊的比較

	埃及斑蚊	白線斑蚊
蟲卵抗旱能力	乾燥 <b>6個月</b> 尚有孵化能力	乾燥 <b>3個月</b> 尚有孵化能力
喜好產卵環境	積水的 <b>人工</b> 容器(花瓶、花盆底盤、水桶等)	積水的 <b>人工</b> 容器、 <b>天然</b> 容器(椰子殼、樹洞、竹節凹槽)
外觀特徵	共同：都是 <b>黑色</b> 並且腳上有白斑	
	胸部背面有一對 <b>彎曲白線條紋</b> ，及中間2條縱線	胸部背側有一條 <b>白色線條</b>
成蟲棲息習性	<b>室內</b> 陰暗的環境，如深色窗簾、衣服、傢俱縫隙及各陰暗處	<b>室外</b> 孳生源附近的草叢等植物或暗處
雌蚊活動時間	<b>白天</b> (朝九晚五)：吸血高峰期為 <b>上午8-10</b> 和 <b>下午4-5</b> 時	
吸血對象	以人為主	人、貓狗等哺乳類動物
叮咬習性	<b>警覺性高</b> ，容易被驚擾而 <b>中斷吸血</b> 並頻繁更換吸血對象	<b>警覺性低</b> ，不容易被驚擾，常會在同一宿主吸飽後才離開
疾病傳播速度	快	慢
吸血後產卵數	100~150粒	80~120粒
成蚊平均壽命	雌蟲：30天 雄蟲：15天	雌蟲：14天 雄蟲：15天
主要分佈地區	北迴歸線以南(台南、高雄為主)	全台海拔1,500公尺以下平地及山區



白線斑蚊(雌蚊)



埃及斑蚊(雌蚊)

※中斷式吸血：埃及斑蚊的一大習性，由於容易被驚嚇而離開原吸血對象轉到下一個，所以相較白線斑蚊，埃及斑蚊更容易吸食多名宿主而加強了疾病傳播能力

發布單位：預設單位